

今回から世界各地の恐竜化石に目を向けてみたいと思います。恐竜が私たち人類の認識を得たのは、1800年代前半のことです。学術論文の記録に基づくと、イギリスのウィリアムバックランドが、メカロサウルスという肉食恐竜を命名したのが最初です。また、同じ時期に、医師のギテオン・マンテルは、草食恐竜イグアノドンを命名する論文を発表しています。このように「恐竜学」は19世紀のイギリスでスタートしました。

イギリスの恐竜化石産地は、イングランド南部に集中しています。ワイト島は、イギリス本土からフェリーで約40分のところにあり、海岸には白亜紀前期から新生代の地層がよく露出しています(写真上)。左奥に見える白い崖は、石灰質の殻をもったプランクトンが海底に堆積してきた「チョーク」です。以前はこの石で黒板に文字を書いていたこともありました。海岸には骨の化石が「コロコロ」落ちていくわけではなく、見つかると恐竜の足跡化石がすぐに見つかりました(写真下)。ここでは、イグアノドンのほか、エオティファヌスと呼ばれる原始的なティラノサウルス類の化石も発見されていて、ティラノサウルス類がヨーロッパ起源である可能性が示されています。

(写真/恐竜博物館池上直樹)

恐竜時代への旅

第31話

イギリス・ワイト島の恐竜



DATA

①ワイト島の南海岸と、イグアノドン類の足跡化石②。南海岸手前の崖は白亜紀前期の地層で、左奥に見える白色の崖は白亜紀のチョーク。足跡化石は雄型の状態で海岸に転がっている。

Book 今月の本

弥勒

篠田 節子 著

新聞社社員、英彰は政変で国交を断絶したパスキムに単身で潜入を試みる。目にしたものは虐殺された僧侶たちの姿だった。救いとは何かを問う渾身の超大作。



謎解きはディナーのあとで2

東川 篤哉 著

「失礼ながら、お嬢様の眼は節穴でございますか?」。令嬢刑事と毒舌執事が難事件に挑む。ユーモアたっぷりの本格ミステリー。



新刊書情報

11月は28冊の本が入りました

- 一般書 (26冊)
 - 小説/DS刑事 (七尾与史 著)
 - 小説/ゆんでめて (島中 恵 著)
 - 園芸/素敵なナチュラルガーデン (講談社 著)
- 児童書 (2冊)
 - 絵本/ぼうしのおうち (エルサ・ベスコフ 著)

ベッキーのたんじょうび

ターシャ・テューダー 絵・文
一生忘れることのない思い出を子どもに贈りたい。物語は夏の日。ベッキーの10歳のおたんじょうびの日。このお話はターシャ・テューダー一家の実話。



Library Information

町立図書館 カルチャーセンター1F
☎ 282-0888 休館日/毎週月曜日

子育て日記



長男・祐海くん (9歳・右)
次男・新太くん (6歳・左)

ありがとう

わが家の子どもは小学校3年生のお兄ちゃんと年長兄の弟の2人兄弟。少しわがままなところもあるお兄ちゃんですが、弟と仲良く遊んでくれる優しい面もあります。弟はとても愛きょうがよく、悪いことをしてもなぜか周りが笑顔になってしまうそんな存在です。毎日、この子たちと過ごしていると「ありがとう」という感謝の気持ちでいっぱいになります。そして、来年は3人目を出産予定。お兄ちゃんたちはすごく楽しみにしているようで私の体を気遣ってくれて、2人には感謝の毎日です。子どもたちがこれからも素直に育ってくれることを願い、夫婦で見守っていきたくと思っています。パパ、祐海、新太、そして生まれてくる子どもに「ありがとう」。こんなママですが、これからもよろしくね!!

(文・写真/陣・城本あゆみお母さん)

健康へのヒント

脳卒中の症状は早めに病院へ



御船町の死亡原因で3番目に多い「脳卒中」は、これから寒くなる冬場に起こりやすくなる病気です。脳卒中は、脳の血管が詰まる「脳梗塞」、脳の血管が破れて出血する「脳出血」や「くも膜下出血」などが起ります。その中で脳梗塞が起こる前触れの症状にはマシ方の手足や顔半分の麻痺、しびれマロレットが回らない、言葉が出ない、立てない、歩けない、ふらつくマシ方の目が見えない、

い、物が二つに見える、視野の半分が欠けるマシ激しい頭痛などが起こります。対応が遅れると麻痺や寝たきりの重症化を引き起こします。もしも症状が現れたら可能な限り早く病院で、治療を開始することが大切です。脳卒中を予防するためには①血圧管理②ストレス解消③休息と睡眠④食生活⑤運動⑥健診を心がけることが必要といえます。

見逃さないで危険のサイン

脳卒中で一番の危険因子は高血圧です。冬場は、脱水、気温の差などから血圧が上がりがやすく、脳卒中の危険が高まります。血圧の自己測定や管理が大切です。保健センターでは、血圧の測定や相談にに応じていますので、お気軽にご利用ください。

☎ 保健センター ☎ 282-1602

血圧と脳卒中の関係

血圧値	脳卒中危険度
120/80mmHg未満	なし
140/90mmHg以上	3倍
180/110mmHg	9倍